УДК 615.212.7.099 ББК 67.408

Кардашян Р.А. Синдром отмены при героиновой наркомании (клинико-биохимичеекие корреляции, критерии степени тяжести и дифференцированная терапия). - М.: Издательство МГОУ, 2010 - 128 с

В монографии представлены клинические и биохимические (уровень мейромедиаторов в моче) показатели при течении героинового синдрома отмены. Определены клинико-биохимичеекие корреляции между степенью тяжести героинового синдрома отмены и показателями экскреции катехоламинов, серотонина с мочой, и соотношениями свободных форм катехоламинов. Разработаны дополнительные критерии степени тяжести синдрома отмены в зависимости от изменений уровней катехоламинов и серотонина в моче, и соотношений свободных форм катехоламинов. На основе установленных клинико-биохимических корреляций предложен дифференцированный терапевтический подход к купированию синдрома отмены при героиновой наркомании.

Книга предназначена для врачей психиатров-наркологов. Документ скачан с сайта "Медицинская книга" - http://www.mmbook.ru

ISBN 978-5-7017-1458-6

© Р.А. Кардашян, 2010 О Издательство МГОУ, 2010

Содержание

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
введение	8
ГЛАВА І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ	
ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 2:	5
ГЛАВА 11. ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА ОТМЕНЫ 3	4
2.1. Клиническое течение	4
2.2. Показатели экскреции катехоламинов и серотонина с мочой,	
соотношений свободных форм катехоламинов	6
2.3. История болезни, статус больного и терапия	8
ГЛАВА III. Умеренная степень тяжести синдрома отмены	7
3.1. Клиническое течение 4	7
3.2. Показатели экскреции катехоламинов и серотонина с мочой,	
соотношений свободных форм катехоламинов	9
3.3. История болезни, статус больного и терапия 5	1
ГЛАВА IV. ВЫРАЖЕННАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА	
ОТМЕНЫ 6	1
4.1. Клиническое течение 6	1
4.2. Показатели экскреции с мочой катехоламинов и серотонина,	
соотношений свободных форм катехоламинов. 63	3
4.3. История болезни, статус больного и терапия 6	5
ГЛАВА V. КОРРЕЛЯЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ	
ГЕРОИНОВОГО СИНДРОМА ОТМЕНЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ	
ЭКСКРЕЦИИ КАТЕХОЛАМИНОВ И СЕРОТОНИНА С МОЧОЙ,	
СООТНОШЕНИЙ СВОБОДНЫХ ФОРМ КАТЕХОЛАМИНОВ	7
ГЛАВА VI. ОСНОВНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ	
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ	
ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА ОТМЕНЫ	8
6.1. Дополнительные критерии степени тяжести синдрома отмены	
при героиновой наркомании	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 10	
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК)4