

СОДЕРЖАНИЕ:

Предисловие	5
ГЛАВА 1. Теоретические аспекты гиперестезии зубов.	7
1.1. Что означает термин гиперестезия?	7
1.2. Как часто встречается гиперестезия?	7
1.3. Каков механизм развития гиперестезии?	7
Глава 2. Причины гиперестезии зубов.	14
2.1. Каковы причины развития гиперестезии зубов?	14
2.2. Какова классификация гиперестезии?	15
2.3. С чем связано появление гиперестезии после препарирования витальных зубов?	16
2.4. С чем связана чувствительность эмали зубов?	17
Глава 3. Диагностика и лечение гиперестезии зубов.	23
3.1. Как проводить обследование больного с гиперестезией зубов?	23
3.2. Имеются ли технические приемы снижения боли при препарировании зуба?	24
3.4. Какие существуют методы лечения гиперестезии зубов?	25
3.5. Какие средства гигиены показаны при лечении гиперестезии зубов	36
3.6. Возникает ли гиперестезия после отбеливания зубов?	46
3.7. Является ли гиперестезия после пломбирования зубов композиционными материалами неизбежным состоянием? Как предупредить гиперестезию в этом случае?	46
3.8. Что эффективнее для устранения гиперестезии зубов: зубные пасты , ополаскиватели или совместное их применение?	59
3.9. Могут ли средства гигиены вызывать гиперестезию зубов?	59
3.10. С чем связано появление гиперестезии после проведения профессиональной гигиены полости рта?	59
3.11. Какова эффективность материала «Ремогель» при лечении гиперестезии зубов?	60
3.12. Какова методика применения препарата «Ремогель»?	63

3.13. Есть ли особенности лечения гиперестезии при заболеваниях пародонта? 64

Список литературы 72

Документ скачан с сайта <http://www.mmbook.ru>

Предисловие

На современном стоматологическом приеме врачи все чаще сталкиваются с жалобами пациентов на повышенную чувствительность зубов, характеризующуюся острой кратковременной болью в ответ на воздействие температурных, химических и механических раздражителей. Наряду с изучением некариозных поражений, кариеса и заболеваний пародонта, данная проблема становится более актуальной, поскольку распространенность ее достаточно высока. В настоящее время не существует комплекса эффективных лечебных и профилактических мероприятий для купирования гиперестезии, так как нет точно установленных причин ее возникновения. Каждый 5-й взрослый человек в мире страдает от гиперестезии зубов. В России 62% населения в возрасте 30-59 лет предъявляют жалобы на гиперчувствительность зубов. Известно, что женщины отмечают это заболевание гораздо чаще, чем мужчины, причем наибольшая частота признаков заболевания отмечена у лиц в возрасте 30-40 лет.

Строго говоря, термин «гиперестезия» не совсем верный: дентин зуба, будучи иннервированной тканью, обладает не повышенной, а нормальной чувствительностью. В норме дентин покрыт эмалью, а цемент - десной; при обнажении дентина чувствительность зуба повышается, что характерно для кариеса и некариозных поражений. Еще одной причиной гиперестезии может стать обнажение корней зубов при заболеваниях пародонта.

В настоящее время развитие эстетической стоматологии с использованием композитных материалов, адгезивных систем, витального отбеливания зубов, современных методов ортодонтического и пародонтологического лечения, средств профессиональной и индивидуальной гигиены повышают частоту гиперестезии и делают вопрос лечения и профилактики гиперчувствительности дентина одним из актуальных.

Лечение гиперестезии зависит от причины ее развития и имеет свою историю, связанную с применением различных химических препаратов, физических